

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES
C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 104 -

16 MAI 1969

AVERTISSEMENTS

POMMIER - POIRIER

- TAVELURES : Quelques projections d'ascospores peuvent encore avoir lieu. Par ailleurs, des taches avec production de conidies vont apparaître très prochainement dans les vergers insuffisamment protégés lors des pluies du 5 au 7 Mai. Enfin, les pluies de ces derniers jours ont lessivé en partie les produits.

En conséquence, les arbres se trouvant exposés à de nouvelles contaminations, il y a lieu de renouveler dès que possible la protection des vergers.

POMME DE TERRE DE PRIMEUR

- MILDIOU : Les conditions climatiques étant très favorables à une extension rapide de la maladie, déjà présente en de nombreux points des zones primeuristes, il convient de traiter de toute urgence les parcelles dont la récolte est prévue après le 25 Mai.

POMME DE TERRE DE SEMENCE ET DE CONSERVATION

- MILDIOU : Il est recommandé d'effectuer un premier traitement au cours de la semaine du 19 au 25 Mai sur toutes les variétés sensibles au Mildiou et dont la hauteur atteint ou dépasse 15 à 20 cm.

INFORMATIONS

MAÏS

- VERS GRIS (CHENILLES DE NOCTUELLES) : Chaque année, des dégâts plus ou moins graves de "vers gris" se produisent courant Mai et Juin en divers secteurs et plus spécialement dans le Sud-Finistère.

Il convient donc de visiter régulièrement les cultures et si des attaques étaient observées, d'épandre à la surface du sol, autour des plantes, un appât toxique constitué par du son empoisonné.

Pour 10 kg de son, il faut, en matière active :

50 g d'Aldrine ou d'Heptachlore
ou 70 g de Chlordane
ou 100 g de D.D.T.
ou 300 g de Toxaphène

Distribuer les appâts le soir, après avoir humidifié le son qui doit être "frisé". 30 à 40 kg d'appâts sont nécessaires pour protéger un hectare. On trouve dans le commerce des granulés dont l'emploi est plus commode, mais dont le prix est environ le double de celui des appâts préparés par l'exploitant.

NOTA : Les vers gris s'attaquent à diverses autres cultures : betteraves, carottes, choux, etc... (traitement identique à celui conseillé sur maïs)

BETTERAVE

- PEGOMYIE (MOUCHE) DE LA BETTERAVE : Les premières éclosions et de nombreuses pontes ayant été observées ces jours derniers - dans le Calvados notamment - surveiller les cultures et traiter en cas de besoin avec l'un des produits indiqués dans l'édition spéciale.

S'il y avait également des pucerons, le traitement serait exécuté en utilisant un produit à la fois efficace contre ceux-ci et la Pégomyie (consulter l'édition spéciale).

LIN (Calvados - Plaine de Caen)

- THRIPS : Sa présence est constatée dans les cultures depuis quelques jours. Des dommages étant susceptibles de se produire à la faveur d'un réchauffement de la température, il convient de surveiller les cultures et de s'assurer s'il y a lieu ou non d'intervenir contre ce parasite. Dans ce but, effectuer tous les 20 m, sur le sommet des tiges de lin, un mouvement de fauchage avec la main préalablement humectée. Les Thrips pourront ainsi être repérés et dénombrés. Un traitement sera nécessaire si le nombre moyen d'insectes par fauchage se situe entre 3 et 6.

ECHALOTE ET PORTE-GRAINES D'OIGNON

- MILDIOU : La protection de ces cultures doit être renouvelée dès les prochains jours, suivant les indications déjà fournies dans notre note du 30 Avril dernier.

L'Ingénieur chargé des
Avertissements Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.